CAPÍTULO 2º - Elementos de análisis tensorial y sistemas de coordenadas

2.1 Elementos de Análisis Tensorial: repaso

a) Espacio y plano puntuales: $\mathbb{E}_3$ y $\mathbb{E}_2$.

- son espacios puntuales (espacios afines euclídeos tridimensional y bidimensional)
- referencia vectorial mediante punto *origen*, $O \in \mathbb{E}_3$.
- $\forall P \in \mathbb{E}_3$: $\underline{r}(P) := \underline{OP} \rightarrow$ *vector de posición* del punto P resp. de O.
- lugares geométricos de $\mathbb{E}_3$ y $\mathbb{E}_2$: recta afín o puntual, plano afín, curva C , superficie S . (ij)
- ecuación vectorial de un l.g. (ij): dar $\underline{r}(X)$ para todo X (punto genérico del l.g.)

b) Funciones escalares, vectoriales y tensoriales: campos (pto. vista intrínseco)

- en general: magnitudes variables ($U, \underline{v}, \underline{T}$) si dependen unívocamente de *una* variable real (" $\alpha \in [a, b] \subset \mathbb{R}$ ", o " $t \dots$ ", ...) o *varias* variables reales (" $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \Omega \subset \mathbb{R}^m$ ", ...) se llaman funciones (escalares, vectoriales o tensoriales) de esas variables α_i .
- campos: son magnitudes variables ($U, \underline{v}, \underline{T}, \dots$) que dependen de los puntos P de una región $\Omega \subset \mathbb{E}_{3(0,2)}$ (*dominio* o *región de influencia* de la magnitud campo).

c) Límites y continuidad de vectores o tensores variables (intr.)

- Def. Límite: $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \underline{u}(\alpha) = \underline{u}_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que $|\alpha - \alpha_0| < \delta \Rightarrow |\underline{u}(\alpha) - \underline{u}_0| < \varepsilon$
- $\underline{u}$ es continua en $\alpha_0 \Leftrightarrow \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \underline{u}(\alpha) = \underline{u}(\alpha_0)$
- Es análogo para tensores, usando como *norma* (módulo):

$$\|\underline{T}\| := \max\{|\underline{T} \cdot \underline{e}_i| : |\underline{e}_i| = 1\} = \max\{\lambda_i \in \sigma((\underline{T}^t \cdot \underline{T})^{1/2})\}$$
- Es análogo si $\underline{u} = \underline{u}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ depende de varias variables (límite múltiple)

d) Derivada de un vector o tensor variable

- Si $\underline{v}$ es función continua de α en $\alpha = \alpha_0$, se define *derivada total*

$$\underline{v}'(\alpha_0) = \frac{d\underline{v}}{d\alpha}(\alpha_0) = \lim_{\Delta\alpha \rightarrow 0} \frac{\Delta\underline{v}}{\Delta\alpha} = \lim_{\Delta\alpha \rightarrow 0} \frac{\underline{v}(\alpha_0 + \Delta\alpha) - \underline{v}(\alpha_0)}{\Delta\alpha}$$

cuando el límite existe.

- Análoga la derivada total para tensores o escalares.

- Si $\underline{v} = \underline{v}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ es continua en $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ se define *1ª der. parcial*

$$\partial_1 \underline{v}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \frac{\partial \underline{v}}{\partial \alpha_1}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lim_{\Delta\alpha_1 \rightarrow 0} \frac{\underline{v}(\alpha_1 + \Delta\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) - \underline{v}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{\Delta\alpha_1}$$

(cuando el límite existe); análogas las demás derivadas parciales

$$\partial_i(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \frac{\partial \underline{v}}{\partial \alpha_i}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

- Análogas, las derivadas parciales para tensores $\underline{T}$ o escalares U .

- Dimensionalmente, la derivada $\partial_{\alpha_i} \underline{u}$ se mide en (uds. de $\underline{u}$) ÷ (uds. de α_i)

- Geométricamente, la derivada se relaciona con una recta tangente $\rightarrow$

• Interpretación geométrica de la derivada

- Caso de una variable independiente
 - trayectoria vectorial de $\underline{u}(\alpha)$ en $\mathbb{V}$.
 - tangente a la trayectoria
- Caso de varias variables independientes
 - trayectoria vectorial de $\underline{u}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ cuando varía *unilateralmente* una variable.
 - ejemplo: $\partial_\rho \underline{r}(\rho, \theta)$ y $\partial_\theta \underline{r}(\rho, \theta)$ en $\mathbb{E}_2$.

• Cálculo de derivadas: reglas de derivación

- Linealidad de la derivación de una c. l. (coeficientes constantes)
- Reglas de Leibnitz para la derivada de un producto
- Regla de la cadena para derivar función de función
- Derivación en componentes

• Ejemplos: a) derivada de vector con módulo constante; b) derivada de $\underline{r} \otimes \underline{r}$ con respecto a x, y, z y con respecto a ρ, θ ; c) Derivar respecto de α el tensor $\underline{T}(\alpha)$ dado en el Ejercicio PR1.31; d) velocidad de P si $\rho = 2t^2$, $\theta = 2\pi t/3$ y parte del origen.

• Derivación sucesiva: derivadas de orden superior

- se suponen conocidas las derivadas de orden superior al primero.

• Uso de la Regla de la cadena: árbol de dependencia

El árbol (o cadena) de dependencia es un esquema de las conexiones de las variables *dependientes*, *intermedias* e *independientes*.

Ejemplos:

- 1) Un vector $\underline{u}$ del plano $\mathbb{E}_2$, inicialmente unitario, gira alrededor de su origen, a razón de ω rad/sec, a la vez que se alarga a razón de μ cm/sec. Calcular el vector $\underline{u}'(t)$ en una base ortonl. polar.
- 2) Si $\underline{w} = (u^2+v^2)\underline{i} + (u+v^2)\underline{j} + uv\underline{k}$ y además $u = acost$, $v = asent$, calcular $\underline{w}'_t$ en el punto en que $t = 0$ y en t genérico.

$$t \leftarrow \begin{matrix} \alpha_1 \rightarrow t \\ \dots \rightarrow t \\ \alpha_m \rightarrow t \end{matrix} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial \alpha_1} \frac{d\alpha_1}{dt} + \dots + \frac{\partial v}{\partial \alpha_m} \frac{d\alpha_m}{dt}$$

una variable independiente, t ; varias variables intermedias α_i

$$\left. \begin{matrix} u \\ v \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \alpha_1 \rightarrow u \\ \dots \rightarrow v \\ \alpha_m \rightarrow v \end{matrix} \right. \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial \alpha_1} \frac{\partial \alpha_1}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial \alpha_1} \frac{\partial \alpha_1}{\partial u} + \dots + \frac{\partial w}{\partial \alpha_m} \frac{\partial \alpha_m}{\partial u}$$

dos var. independientes, u, v ; varias v. intermedias

e) Func. de más interés: (1) lugares geométricos

•Descripción analítica de lugares geométricos: vec. posición

Si $\Omega \subset \mathbb{E}_3$ ($\mathbb{E}_2$) es un l.g. *regular* (o regular a trozos), es decir, un *arco de curva* C , un *casquete de superficie*, S , o un *volumen sólido*, V , encerrado por una sup. cerr.) es posible dar el vector posición $\underline{r}(P)$ de $\forall P \in \Omega$ en función de uno, dos o tres variables (parámetros). Así:

Ecuación vectorial: Dar $\underline{r} = \underline{r}(P)$, $\forall P \in \Omega$; Ecs. paramétricas: la vectorial separada por coordenadas de P (cartesianas o curvilíneas):

•1) una **curva** $C : \underline{r}(P) = \underline{r}(\alpha)$ si la relación $\alpha \rightarrow P := \gamma(\alpha)$ es biunívoca, al menos en un intervalo $[a_0, a_1] \subset \mathbb{R}$. La traza de la func. vect. $\underline{r}(\alpha)$ en $\mathbb{E}_3$ es la curva C .

•La ec. vect. puede separarse por coordenadas cartesianas, $x_i = x_i(\alpha)$, y resultan las llamadas *ecs. paramétricas cartesianas* de C . También se pueden separar por coordenadas curvilíneas

•Ejemplo: la hélice circular de radio R y paso p : definición, ecuación y parametrización

•2) una **superficie** $S : \underline{r}(P) = \underline{r}(\alpha, \beta)$ si la rel. $(\alpha, \beta) \rightarrow P := \sigma(\alpha, \beta)$ es biunívoca, al menos en un región D (= abierto conexo) de $\mathbb{R}_2$, dominio de las (α, β) . La traza bidim. de la función $\underline{r}(\alpha, \beta)$ en $\mathbb{E}_3$ es la superficie S ; tamb. es la imagen de σ .

•La ec. vectorial puede separarse análogamente y se obtienen las ecs. paramétricas de S , del tipo $x_i = x_i(\alpha, \beta)$

•Ejemplo: parametrizar de dos modos la *superficie* exterior de una *bóveda semicilíndrica* de longitud L y radio exterior R .

•3) **sólidos** o reg. tridim. del espacio, se parametrizan en coord. curv. ($\rightarrow$ §2.2)

•Campos

•Campos son funciones escalares, vectoriales o tensoriales de $\mathbb{E}$ en $\mathbb{R}$, $\mathbb{V}$ o $\mathbb{T}^{(p)}$, resp., y representan magnitudes que dependen del punto en que se midan

e) Funciones de más interés: (2) Campos

•Campos escalares, vectoriales y tensoriales (en cartesianas)

Campo = magnitud física que varía en el e.g.o. de un punto a otro. Matemáticamente son funciones de P , que en cartesianas es (x, y, z) ó (x_1, x_2, x_3)

• CAMPO ESCALAR: func. $P \rightarrow U = U(P) \in \mathbb{R}$, definida en $\forall P$ de una cierta región $D \subset \mathbb{E}_3$ (dominio o reg. de influencia).

• Si $P = (x, y, z)$, la expresión cartesiana de U será de la forma $U = U(x, y, z)$

• Ejemplo: temperatura alr. de un foco de calor puntual en O : $U = K/(x^2+y^2+z^2)^{1/2}$

• C. VECTORIAL: func. $P \rightarrow \underline{u} = \underline{u}(P) \in \mathbb{V}_{362}$, definida en $\forall P$ de una cierta región $D \subset \mathbb{E}_{362}$ (dominio o reg. de influencia).

• Si $P = (x, y, z)$, la expr. cartesiana de $\underline{u}$ será de la forma $\underline{u} = \underline{u}(x, y, z) = U_i(x, y, z) \underline{e}_i$

• Ejemplo: velocidad de un punto P de la tierra, supuesta esférica, de radio R .

• C. TENSORIAL: func. $P \rightarrow \underline{\mathbf{T}} = \underline{\mathbf{T}}(P) \in \mathbb{T}^{(2)}$, definida en $\forall P$ de una cierta región $D \subset \mathbb{E}_3$ (dominio o reg. de influencia).

• Si $P = (x, y, z)$, la expresión cartesiana de $\underline{\mathbf{T}}$ será de la forma $\underline{\mathbf{T}} = \underline{\mathbf{T}}(x, y, z) = T_{ij}(x, y, z) \underline{e}_i \otimes \underline{e}_j$.

• Ejemplo: campo tensorial $\underline{\mathbf{T}}(P) = \underline{r}(P) \otimes \underline{e}_r$, siendo éste último el unitario del vec. posición.

•Regularidad matemática de los campos: clase diferencial

•concepto de *clase* de una función en un punto: el orden de la derivada sucesiva continua de mayor orden que admite la func. en ese punto.

•En una región D , la clase es la del punto en que sea menor. Para un campo vect. o tens., la clase dif. es la de la compe. de menor clase.

f) Diferenciales de vectores o tensores variables

•Aproximación del incremento: Diferencial

1. Una variable independiente:

$\Delta \underline{u}(\alpha; \Delta \alpha) = \underline{u}(\alpha + \Delta \alpha) - \underline{u}(\alpha) = \underline{u}'(\alpha) \Delta \alpha + \frac{1}{2} \underline{u}''(\alpha) (\Delta \alpha)^2 + \underline{\varepsilon}(\alpha, \Delta \alpha) (\Delta \alpha)^2$ (Fórmula de Taylor, versión infinitesimal para $\Delta \alpha \rightarrow 0$)

$d\underline{u}(\alpha; \Delta \alpha) := \underline{u}'(\alpha) \Delta \alpha$; $\therefore$ si $\underline{u}'(\alpha) \neq 0$ entonces $\Delta \underline{u}(\alpha; \Delta \alpha) = d\underline{u}(\alpha; \Delta \alpha) + \underline{o}(\alpha, \Delta \alpha)$; donde $\underline{o}(\alpha, \Delta \alpha)$ indica un infinitésimo de orden superior a 1 cuando $\Delta \alpha \rightarrow 0$, o sea, despreciable frente al propio $\Delta \alpha$. O sea: $\Delta \underline{u} \cong \underline{u}'(\alpha) \Delta \alpha = d\underline{u}$: el diferencial de una función es una aproximación de su incremento.

•Lo mismo para las derivadas parciales respecto increm. *unilaterales*: *diferc. parcial*

2. Varias variables independientes (incrementos simultáneos):

$\Delta \underline{u}(\alpha, \beta; \Delta \alpha, \Delta \beta) = \underline{u}(\alpha + \Delta \alpha, \beta + \Delta \beta) - \underline{u}(\alpha, \beta) = \partial_{\alpha} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \alpha + \partial_{\beta} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \beta + \underline{\varepsilon}(\alpha, \beta; \Delta \alpha, \Delta \beta)$

diferencial total: $d\underline{u}(\alpha, \beta; \Delta \alpha, \Delta \beta) := \partial_{\alpha} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \alpha + \partial_{\beta} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \beta$; $\underline{u}$ *diferenciable total*:

$\Delta \underline{u} \cong \partial_{\alpha} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \alpha + \partial_{\beta} \underline{u}(\alpha, \beta) \Delta \beta$, si alguna $\partial_{\alpha} \underline{u}(\alpha, \beta) \neq 0$

Ejemplo: 1) Expresar el diferencial del campo $\underline{u}(x, y) = (2x^2 - y^2)\underline{i} + xy\underline{j}$ en el pto. (2, -3)

2) Aproximar la longitud diferencial del arco de curva C , dada por la ec. vect. $\underline{r} = \underline{r}(\alpha)$.

g) Integrales de vectores o tensores resp. una var. ind.

•Integral indefinida de un vector o tensor respecto de una variable

definición y propiedades $\rightarrow$ análogas a la int. unidim. de Riemann
cálculo $\rightarrow$ ejemplo: Calcular $\int \underline{u}(x) dx$ siendo $\underline{u}(x) = xe_1 + 2x^{1/2}e_2$

•Integral definida de un vector o tensor respecto de una variable

definición y propiedades: como las funciones reales de 1 variable:
cálculo (Regla de Barrow componente a componente, si la base es constante)

$$\int_{\alpha_0}^{\alpha_1} \underline{u}(\alpha) d\alpha = \left(\int_{\alpha_0}^{\alpha_1} u_i(\alpha) d\alpha \right) \underline{e}_i$$

•Ecuaciones diferenciales en términos vectoriales

e.d.o. cuya función incógnita es un vector

reducción a e.d.o. escalares por separación de componentes

Ejemplo: líneas de campo de un campo vectorial $\underline{v}(x, y, z) = V_i(x, y, z)\underline{e}_i$
son las curvas $\underline{r} = \underline{r}(\alpha) / \underline{r}'(\alpha) = \underline{v}(x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha)) \rightarrow$ se separa en un sistema de 3 e.d.o.