§ 2.2 Sistemas de coordenadas de los espacios puntuales $\mathbb{E}_2$ y $\mathbb{E}_3$: (panorama)

•Repaso: Sist. coord. cartesianas

- se presentan como esquema-modelo de los demás sist. curvilíneos.
- Representaciones gráficas usuales: lug. geom. coordenados: lín. coord. y planos coord. de cada P; *isocuantas* de campos esc.; *lín. de campo* o lín. de acción de c. vect.

•a)Sist. coord. curvilíneas: Definiciones básicas

- introducción por *relaciones de transformación* : $x_i = x_i(u^1, u^2, u^3)$
- *bases natural y recíproca*: interpr. geométrica y l.g. coordenados del sist. curvilíneo: matrices jacobianas J y J^{-1} .
- matriz fundamental o *matriz de Gram* del sist. curvilíneo, G
- c. vect.: comp. naturales contra variantes y covariantes
- c. tens.: comp. nat. contra-cova, cova-cova, etc...

•b)Derivación de la base natural: símbolos de Christoffel

- definición de símbolos de Christoffel: compts. de las deriv. bases
- cálculo matricial de los símbolos: dos métodos

•c)Cambios de sistemas de coordenadas

- Relaciones de transformación entre coordenadas curvilíneas
- Matriz del cambio de las bases naturales de dos sistemas curv.

Repaso: Sistema de coordenadas cartesianas

• Elementos básicos (Apuntes, §2.2a)

- líneas coordenadas y planos coordenados** por un punto P_0 .
- base cartesiana**, constante *en cada punto*, $\{\underline{e}_i\}$ o $\{\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}\}$, ortonormal y bien orientada

Obs.: $\underline{e}_i = \partial_{x_i} \underline{r}$ = deriv. de la traza o trayectoria de $\underline{r}$ cuando sólo varía la coord. x_i .

• Campos escalares, vectoriales y tensoriales en cartesianas:

- $U = U(x, y, z) \rightarrow$ se representa gráficamente mediante *sup. de nivel*, determinadas por cumplir $U = \text{cte.} = U(P_0)$ (o *isocuantas*)
- $\underline{u} = \underline{u}(x, y, z) = U_i(x, y, z) \underline{e}_i \rightarrow$ se representa graf. mediante las *líneas de acc.* o *lín. de campo*, curvas determinadas por cumplir $d\underline{r} / dt = \underline{u}(P(t))$, que es la ec. dif. vc. de las lín. de c. y puede separarse por componentes cartesianas: $U_i(x(t), y(t), z(t)) = dx_i / dt$, siendo $x_i(t)$ las func. incógn.

•Ejemplos:

- *líneas de nivel* de un c. escalar plano: $U(x, y) = c$ ►
- *líneas de campo* de un c. vect. en el plano: $d\underline{r}/dt = \underline{v}(t)$ ►
- *aljabas* de un c. vect. ►

a) Sistemas de c. curvilíneas: elementos básicos

Dado sist. cartesiano $\{O; e_i\}$ o bien $\{O; (x, y, z)\} = \{O; (x_i)\}$ (subyacente o asociado), se define:

• **Coord. curvilíneas** : (u, v, w) o u^i o x^i son coord. curvilíneas de P si determinan P *biunívocamente* y de forma *diferenciable* en una *región* $\Omega \subset \mathbb{E}_3$, es decir:

$\exists \mathcal{D} = \text{región} \subset \mathbb{R}^3, \exists \text{biy. diferenciable } \Phi : \mathcal{D} \rightarrow \Omega$, tales q. $(x, y, z) = \Phi(u, v, w)$, o sea

$$x = \Phi_1(u, v, w) = x(u, v, w), y = \Phi_2(u, v, w) = y(u, v, w), z = \Phi_3(u, v, w) = z(u, v, w)$$

o bien:

$$x_i = \Phi_i(x^1, x^2, x^3) = x_i(x^1, x^2, x^3).$$

$\mathcal{D} :=$ dominio de la parametrización de Ω en (u, v, w) o x^i .

$\Omega :=$ región parametrizada del espacio $\mathbb{E}_3$ en (x, y, z) o x^i .

NOTA: es análogo en el plano $\mathbb{E}_2$.

Entonces: $\forall P \in \Omega: r(P) = x_i(u, v, w) e_i := r(u, v, w)$

• **relaciones de transformación de coordenadas**: las dadas por la biy. $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3)$ y su inversa $\Phi^{-1} = \Psi (\Psi^1, \Psi^2, \Psi^3)$, que da las coord. curv. en func. de las cart.: $x^i = \Psi^i(x_1, x_2, x_3)$: ambas determinan el sistema de referencia curvilíneo. La matriz jacobiana de $\Phi, J(\Phi) := [\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)]$; la de $\Psi, [\partial(u, v, w)/\partial(x, y, z)] = J^{-1}$, es la inversa de la J de Φ .

• **dominio de regularidad** del sist. curv. es el de las relaciones Φ , o sea

$$\mathcal{D} = \{(u, v, w) \mid \Phi \text{ es dif. \& } \det J(\Phi) = \det[\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)] \neq 0\}$$

(condiciones de existencia de *función inversa diferenciable* $\Phi^{-1} = \Psi$).

Ejemplo: región de regularidad de las coordenadas esféricas del espacio

• **lug. geom. coordenados**: determinados haciendo constantes coordenadas *curvilíneas*:

• **Líneas coordenadas** por $P(u_0, v_0, w_0) \in \Omega \subset \mathbb{E}_3$: son las curvas dadas por las ecs. paramétricas curvilíneas sgtes.:

$$\mathcal{L}_u(P) := \{u = t, v = v_0, w = w_0\} \text{ y análogas } \mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w$$

y consisten en las curvas $r = r(t)$ descritas en cart. como:

$$\mathcal{L}_u(P) = \{x_i = \Phi_i(t, v_0, w_0); t \in I_t\} \text{ y análogas } \mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w$$

Son, pues, las trazas de $r(u, v, w)$ cuando varía unilateralmente cada coord. curv. por separado (l.g. unidimensionales). Son además la imagen por Φ de las líneas coord. de $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^3$. ▶

• **Superf. coordenadas**: por $P(u_0, v_0, w_0)$:

$$\mathcal{S}_{uv}(P) := \{u = \alpha, v = \beta, w = w_0; (\alpha, \beta) \in \mathcal{D} \cap \{w = w_0\}\} \text{ y análogas } \mathcal{S}_{uw} \text{ y } \mathcal{S}_{vw}$$

y consisten en las superficies $r = r(\alpha, \beta)$ descritas en cart. como:

$$\mathcal{S}_{uv}(P) = \{x_i = \Phi_i(\alpha, \beta, w_0); (\alpha, \beta) \in \mathcal{D} \cap \{w = w_0\}\} \text{ y análogas } \mathcal{S}_{uw} \text{ y } \mathcal{S}_{vw}$$

Son, pues, los l.g. descritos (bidimensionales) por $r(u, v, w)$ cuando permanece constante cada coord. curv. por separado; tamb. son la traza bidim. de r cuando varían sólo dos coord. curv.

• **Obs.**: 1) los vectores $\partial_u r(P), \partial_v r(P), \partial_w r(P)$ dirigen las líneas coord. $\mathcal{L}_u, \mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w$ del sist. curv. en cada punto P del dom. de regularidad.: por el concepto e interpretación geométrica de cada derivada parcial.

2) En el dominio de regularidad, esos tres vectores son lin. indep. y formarán la base natural del sist. curvilíneo (N.: esta base será variable de un punto a otro de Ω).

- **Aplicaciones: Parametrización de l. g. en curvilíneas:** análogo a cartesianas
 - **curvas** $C \equiv \{u^i = u^i(t); t \in I_C \subset \mathbb{R}\} \rightarrow P$ genérico en función de un parámetro
 - **superficies** $S \equiv \{u^i = u^i(\alpha, \beta); (\alpha, \beta) \in D_S \subset \mathbb{R}^2\} \rightarrow P$ genérico en func. de dos parámetros
 - **sólidos** $V \equiv \{u^i = u^i(\alpha, \beta, \gamma); (\alpha, \beta, \gamma) \in D_V \subset \mathbb{R}^3\} \rightarrow P$ genérico en función de tres parámetros
- **celda elemental curvilínea:** dV en curvilíneas = $[g_u, g_v, g_w] du dv dw$ ▶
- **Base natural del sist. curvilíneo:**

Def.: dom. de regularidad $\Omega := \{P / g_i(u, v, w) := \partial x^i / \partial u^j\}$ es una base de $\mathbb{V}$, $\{g_i(P)\}$, asociada al punto P , llamada *base natural* del sistema curvilíneo

obs: cada vector $g_i(u, v, w)$ expresado en $\{e_i\}$ es una columna de la **matriz jacobiana**, J , de Φ , cuyo determ. es $\neq 0$ en los P del dom. reg., debido a la condición de biyección diferenciable de Φ .
- **Matriz fundamental del sist. curv.**

def.: Es la matriz de Gram de la base natural: $G(u, v, w) = [g_{ij}(u, v, w)] = [g_i(u, v, w) \cdot g_j(u, v, w)]$

cálculos: $G(u, v, w) = J^T \cdot J$; $g = \det G(u, v, w) = (\det J)^2$.
- **Base natural recíproca del sist. curvilíneo:**

Def.: La base recíproca de la natural, $\{g^i(u, v, w)\}$, se llama base recíproca nat. y se obtiene en la **filas** de $J^{-1}(u, v, w)$.
- **Sist. de coordenadas ortogonales: base física**

Def.: Si la base natural $\{g_i(P)\}$ es *ortogonal* el sist. de coord. se dice *ortogonal* y la base ortonormal que resulta al normalizarla se llama *base física* del sist. y se denota $\{\hat{e}_i(u, v, w)\}$. **Cálculo** a partir de J .
- **Ejemplos: sist. de coordenadas clásicos**
 - **polares:** $\{x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta; \rho > 0, 0 \leq \theta < 2\pi\}$ ▶
 - **cilíndricas:** $\{x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z; \rho > 0, 0 \leq \theta < 2\pi\}$ ▶
 - **esféricas:** $\{x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi; r > 0, 0 < \varphi < \pi, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ \hat{e}_u & \hat{e}_v & \hat{e}_w \\ | & | & | \end{bmatrix}}_{\text{base física en base cartesiana}} = \underbrace{J(u, v, w)}_{\text{base nat. en cartes.}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{|g_u|} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{|g_v|} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{|g_w|} \end{bmatrix}}_{\text{factores de escala} = \sqrt{G}} = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ \frac{g_u}{|g_u|} & \frac{g_v}{|g_v|} & \frac{g_w}{|g_w|} \\ | & | & | \end{bmatrix}}_{\text{base nat. normalizada en cartes.}} \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ e_i & e_j & e_k \\ | & | & | \end{bmatrix}}_{\{e_i\}}$$

b) Derivación de la base natural: símbolos de Christoffel

• Se definen Γ^k_{ij} como la k^a comp. contra de $\partial g_i / \partial x^j$ en la base natural $\{g_k\}$, es decir, por def.:

$$\frac{\partial g_i}{\partial x^j} := \Gamma^k_{ij}(x^1, x^2, x^3) g_k(x^1, x^2, x^3) \Rightarrow \Gamma^k_{ij} = g^k \cdot \frac{\partial g_i}{\partial x^j} = \frac{\partial x^k}{\partial x_h} \frac{\partial^2 x_h}{\partial x^i \partial x^j}$$

• Propiedades: i) $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$; ii) $\frac{\partial g^i}{\partial x^j} = -\Gamma^i_{jk} g^k$

• Se pueden calcular por cajas a partir de la matriz jacobiana J

$$[\Gamma^k_{ij}]_{k=f, i=c, j=m} = J^{-1} \cdot \frac{\partial J}{\partial x^j}(x^1, x^2, x^3)$$

Ejemplos: Cilíndricas y esféricas. PR2.1 á 7

La disposición alternativa $[\Gamma^k_{ij}]_{k=m, i=f, j=c}$ se puede obtener de la anterior (como con los tens. de 3er. orden). Se puede obtener cada caja, una a una, en las dos formas de disposición matricial: ▶

• Se pueden calcular tb. a partir del tensor métrico o matriz de Gram, G

si $A_i = \partial_i(G)$, $B_i =$ tres i^{mas} cols. de las A 's, $C_i = B_i^t$ entonces: ▶

$$[\Gamma^k_{ij}]_{k=f, i=c, j=m} = \frac{1}{2} G^{-1} \cdot [A_j + B_j - C_j]; [\Gamma^k_{ij}]_{k=m, i=f, j=c} = \frac{1}{2} G^{-1} * [B_h + C_h - A_h]_{i=cm};$$

Expresiones matriciales (1)

$$J(u, v, w) = \begin{bmatrix} \partial(x, y, z) \\ \partial(u, v, w) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \frac{\partial r}{\partial u} & \frac{\partial r}{\partial v} & \frac{\partial r}{\partial w} \\ | & | & | \end{bmatrix}_{\{e_i\}} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ g_u & g_v & g_w \\ | & | & | \end{bmatrix}_{\{e_i\}} ; G = J^t \cdot J$$

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} \partial(x, y, z) \\ \partial(u, v, w) \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \partial(u, v, w) \\ \partial(x, y, z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ g_u & g_v & g_w \\ | & | & | \end{bmatrix}_{\{e_i\}}^{-1} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ i & j & k \\ | & | & | \end{bmatrix}_{\{e_i\}} = \begin{bmatrix} - & | \sigma^u & - \\ - & | \sigma^v & - \\ - & | \sigma^w & - \end{bmatrix}_{\{e_i\}}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial g_i}{\partial x^j} = \Gamma^k_{ij} g_k \\ \frac{\partial g^i}{\partial x^j} = -\Gamma^i_{jk} g^k \end{cases} \quad \begin{cases} [\Gamma^k_{ij}]_{k=f, i=c, j=m} = J^{-1} \cdot \frac{\partial J}{\partial x^j} \quad (\Leftrightarrow \text{pasar a curv. contras las deriv. parc. de los } g\text{'s}) \\ \begin{bmatrix} \Gamma^1_{11} & \Gamma^1_{21} \\ \Gamma^2_{11} & \Gamma^2_{21} \end{bmatrix}_{j=1}, \begin{bmatrix} \Gamma^1_{12} & \Gamma^1_{22} \\ \Gamma^2_{12} & \Gamma^2_{22} \end{bmatrix}_{j=2} \Leftrightarrow [\Gamma^k_{ij}]_{k=f, i=c, j=m} \\ \begin{bmatrix} \Gamma^1_{11} & \Gamma^1_{12} \\ \Gamma^1_{21} & \Gamma^1_{22} \end{bmatrix}_{k=1}, \begin{bmatrix} \Gamma^2_{11} & \Gamma^2_{12} \\ \Gamma^2_{21} & \Gamma^2_{22} \end{bmatrix}_{k=2} \Leftrightarrow [\Gamma^k_{ij}]_{k=m, i=f, j=c} \end{cases}$$

Expresiones matriciales (2): Símbolos de Christoffeln desde la matriz de Gram (en dimensión $n = 2$; análogo, si $n = 3$)

$$G = [g_{ij}(u, v, w)]$$

$$A_1 := \frac{\partial}{\partial u} G = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial u} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{21} & \frac{\partial}{\partial u} g_{22} \end{bmatrix}; A_2 := \frac{\partial}{\partial v} G = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial v} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{21} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}; (A_3 := \frac{\partial}{\partial w} G)$$

$$B_1 := \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{11} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{21} & \frac{\partial}{\partial v} g_{21} \end{bmatrix}; B_2 := \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{12} & \frac{\partial}{\partial v} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{22} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}; (B_3 = \dots)$$

$$C_1 := B_1' = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial u} g_{21} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{21} \end{bmatrix}; C_2 := B_2' = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{12} & \frac{\partial}{\partial u} g_{22} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{12} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}; (C_3 = B_3' = \dots)$$

$$[\Gamma_{ij}^k]_{k=f, i=c, j=m} = \frac{1}{2} G^{-1} \cdot [A_j + B_j - C_j], \text{ (para } j = 1, 2, (3))$$

$$\begin{bmatrix} [\Gamma_{ij}^1] \\ [\Gamma_{ij}^2] \end{bmatrix}_{k=m, i=f, j=c} = \frac{1}{2} G^{-1} * \begin{bmatrix} B_1 + C_1 - A_1 \\ B_2 + C_2 - A_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} g^{11}[B_1 + C_1 - A_1] + g^{12}[B_2 + C_2 - A_2] \\ g^{21}[B_1 + C_1 - A_1] + g^{22}[B_2 + C_2 - A_2] \end{bmatrix}$$

Nota: Por la simetría de G , también se pueden obtener las $B_i = 2$ i-ésimas filas de las A 's puestas en columnas

Expresiones matriciales (2: Símbolos de Christoffeln desde la matriz de Gram, alternativa válida para las cajas B_i)

$$G = [g_{ij}(u, v, w)]$$

$$A_1 := \frac{\partial}{\partial u} G = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial u} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{21} & \frac{\partial}{\partial u} g_{22} \end{bmatrix}; A_2 := \frac{\partial}{\partial v} G = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial v} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{21} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}; (A_3 := \frac{\partial}{\partial w} G)$$

$$B_1 := \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{11} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{12} & \frac{\partial}{\partial v} g_{12} \end{bmatrix}; B_2 := \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{21} & \frac{\partial}{\partial v} g_{21} \\ \frac{\partial}{\partial u} g_{22} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}$$

$$C_1 := B_1' = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{11} & \frac{\partial}{\partial u} g_{12} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{11} & \frac{\partial}{\partial v} g_{12} \end{bmatrix}; C_2 := B_2' = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_{21} & \frac{\partial}{\partial u} g_{22} \\ \frac{\partial}{\partial v} g_{21} & \frac{\partial}{\partial v} g_{22} \end{bmatrix}$$

$$[\Gamma_{ij}^k]_{k=f, i=c, j=m} = \frac{1}{2} G^{-1} \cdot [A_j + B_j - C_j], \text{ (para cada } j = 1, 2, (3))$$

$$\begin{bmatrix} [\Gamma_{ij}^1] \\ [\Gamma_{ij}^2] \end{bmatrix}_{k=m, i=f, j=c} = \frac{1}{2} G^{-1} * \begin{bmatrix} B_1 + C_1 - A_1 \\ B_2 + C_2 - A_2 \end{bmatrix};$$

N.: Por la simetría de G , también se pueden obtener las $B_i = \text{dos (tres) i-ésimas filas de las } A$'s puestas en columnas

d) Cambio de sist. de coordenadas: relaciones de transf.

Dado un sist. curv. $\{O; x^i\}$, de base natural $\{g_i(x^1, x^2, x^3)\}$, se introduce un sist. curv. nuevo $\{O; \hat{x}^i\}$ si se tienen func. diferenc. de clase 2 al menos, $x^i = x^i(\hat{x}^1, \hat{x}^2, \hat{x}^3) = \xi^i(\hat{x}^1, \hat{x}^2, \hat{x}^3)$ cumpliendo: el jacobiano $F(\xi) = \det[\partial x^i / \partial \hat{x}^j] \neq 0$.

• Matriz de cambio de bases naturales:

$$\left. \begin{array}{l} \hat{x}^1 \swarrow \searrow \\ \hat{x}^2 \swarrow \searrow \\ \hat{x}^3 \swarrow \searrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} x^1 \rightarrow \hat{x}^1 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^2 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^3 \\ x^2 \rightarrow \dots \\ \quad \quad \quad \hat{x}^1 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^2 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^3 \\ x^3 \rightarrow \hat{x}^1 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^2 \\ \quad \quad \quad \hat{x}^3 \end{array} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial \hat{x}^j} = \frac{\partial r}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial \hat{x}^j} \Leftrightarrow \hat{g}_j = \frac{\partial x^i}{\partial \hat{x}^j} g_i \Leftrightarrow \begin{bmatrix} | & | & | \\ \hat{g}_1 & \hat{g}_2 & \hat{g}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}_{\{\hat{g}_i\}} = \begin{bmatrix} \partial(x^1, x^2, x^3) \\ \partial(\hat{x}^1, \hat{x}^2, \hat{x}^3) \end{bmatrix} := F$$

F = matriz del c. de base entre las bases naturales de los dos sistemas.

- Las fórmulas del c. de b. son las vistas en álgebra tens., aplicadas punto a punto, es decir, en un punto genérico.
- Ejemplo: 1) Obtener la matriz del c. de base al sist. de coord. esféricas (r, φ, θ) desde coord. cilíndricas (ρ, θ, z)
- otros ejemplos de cambio de sist.: PR2, ejercicios 6, 7, 11 y apartados de varios de la PR3

e) Aplicaciones: en lugares geométricos y en T^a de Campos

1) Velocidad y aceleración de una trayectoria en curvilíneas

Dada curva C en curv. $C: \{u^i = u^i(t) / t \in [a, b] \subset \mathbb{R}\}$, su velocidad y aceleración son:

$$t \leftarrow \left. \begin{array}{l} u \rightarrow t \\ v \rightarrow t \\ w \rightarrow t \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{\partial r}{\partial u^i} \frac{du^i}{dt} = \frac{du^i}{dt} g_i(u(t), v(t), w(t)) = \frac{du^i}{dt}(t) g_i(t)$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d^2 u^i}{dt^2} g_i + \frac{du^i}{dt} \frac{dg_i}{dt} = \frac{d^2 u^i}{dt^2} g_i + \frac{du^i}{dt} \frac{\partial g_i}{\partial u^j} \frac{du^j}{dt} = \frac{d^2 u^k}{dt^2} g_k + \frac{du^i}{dt} \Gamma^k_{ij} \frac{du^j}{dt} g_k =$$

$$\left(\frac{d^2 u^k}{dt^2} + \frac{du^i}{dt} \Gamma^k_{ij} \frac{du^j}{dt} \right) g_k \Leftrightarrow a^k(t) = \frac{d^2 u^k}{dt^2}(t) + \frac{du^i}{dt}(t) \Gamma^k_{ij}(t) \frac{du^j}{dt}(t)$$

2) Líneas de campo de un c. vectorial

Def. (intrínseca): $C: \{r = r(\alpha) ; \alpha \in I \subset \mathbb{R}\}$ es una línea de campo de un c. v. $v: \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{V}_3$ que pasa por P_0 si $\forall \alpha: \frac{dr}{d\alpha}(\alpha) \parallel v(P(\alpha)), \exists \alpha_0 / r(\alpha_0) = OP_0$

i) En cartesianas, bastará exigir $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}$ a la curva $C: \{x_i = x_i(\alpha)\}$

ii) En curvilíneas, bastará exigir: $\frac{du}{v^1} = \frac{dv}{v^1} = \frac{dw}{v^3}$ a la curva $C: \{x^i = x^i(\alpha)\}$

En ambos casos son un sistema de e.d.o. que deben conducir a cálc. de primitivas elemental cuyas constantes de integración se ajuntan para que C pase por P_0 .

3) Derivación de campos en curv.: derivada covariante

Los símb. de Chr. permiten deducir expresiones de las derivadas resp. x^j de los campos vect. y tensoriales en curv.:

i) c. v. en contras:

$$\begin{aligned} \underline{v} &= v^i(u, v, w) \underline{g}_i(u, v, w) \Rightarrow \frac{\partial \underline{v}}{\partial x^j} = \frac{\partial v^i}{\partial x^j} \underline{g}_i + v^i \frac{\partial \underline{g}_i}{\partial x^j} = \\ &= \frac{\partial v^i}{\partial x^j} \underline{g}_i + v^i \Gamma^k_{ij} \underline{g}_k = \left(\frac{\partial v^k}{\partial x^j} + \Gamma^k_{hj} v^h \right) \underline{g}_k := v^k_{,j} \underline{g}_k \Rightarrow v^k_{,j} = \frac{\partial v^k}{\partial x^j} + \Gamma^k_{hj} v^h \end{aligned}$$

Los escalares $v^k_{,j}$ se llaman *deriv. covariantes* de las cptes. contras de $\underline{v}$

ii) c.v. en covas es análogo: la *derivada covariante* de las comptes.

covas se denota $v_{i,j}$ y es:

$$\underline{v} = v_i \underline{g}^i \Rightarrow \frac{\partial \underline{v}}{\partial x^j} = \frac{\partial v_i}{\partial x^j} \underline{g}^i - v_i \Gamma^i_{jk} \underline{g}^k = \left(\frac{\partial v_k}{\partial x^j} - v_h \Gamma^h_{jk} \right) \underline{g}^k := v_{k,j} \underline{g}^k$$

Ambas derivadas covariantes se pueden obtener matricialmente, tanto para cada j como para todos ellos simultáneamente. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} [v^k_{,j}]_{k=f} &= \frac{\partial}{\partial x^j} [v^k]_{k=f} + [\Gamma^k_{hj}]_{k=f, h=c} [v^h]_{h=f} \\ [v^k_{,j}]_{k=f, j=c} &= \left[\frac{\partial v^k}{\partial x^j} \right]_{k=f, j=c} + v^h [\Gamma^k_{jh}]_{k=f, j=c, h=m} \end{aligned} \quad (\text{y análogo para } v_{k,j})$$

Análogamente se puede razonar con los campos tensoriales:

i) En componentes contra-cova:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{T}} &= t^i_j(u, v, w) \underline{g}_i \otimes \underline{g}^j \Rightarrow \frac{\partial \underline{\mathbf{T}}}{\partial x^k} = \frac{\partial t^i_j}{\partial x^k} \underline{g}_i \otimes \underline{g}^j + t^i_j \frac{\partial \underline{g}_i}{\partial x^k} \otimes \underline{g}^j + t^i_j \underline{g}_i \otimes \frac{\partial \underline{g}^j}{\partial x^k} = \\ &= \frac{\partial t^i_j}{\partial x^k} \underline{g}_i \otimes \underline{g}^j + t^i_j \Gamma^h_{ik} \underline{g}_h \otimes \underline{g}^j - t^i_j \underline{g}_i \otimes \Gamma^j_{kh} \underline{g}^h = \\ &= \left(\frac{\partial t^i_j}{\partial x^k} + t^h_j \Gamma^i_{hk} - t^i_h \Gamma^h_{kj} \right) \underline{g}_i \otimes \underline{g}^j := t^i_{j,k} \underline{g}_i \otimes \underline{g}^j \Rightarrow \boxed{t^i_{j,k} = \frac{\partial t^i_j}{\partial x^k} + \Gamma^i_{hk} t^h_j - t^i_h \Gamma^h_{jk}} \end{aligned}$$

la *derivada covariante* también puede expresarse matricialmente para cada k .

ii) Es análogo en las otras componentes tensoriales posibles. Por ejemplo en covas puras sería:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{T}} &= t_{ij}(u, v, w) \underline{g}^i \otimes \underline{g}^j \Rightarrow \frac{\partial \underline{\mathbf{T}}}{\partial x^k} = \frac{\partial t_{ij}}{\partial x^k} \underline{g}^i \otimes \underline{g}^j + t_{ij} \frac{\partial \underline{g}^i}{\partial x^k} \otimes \underline{g}^j + t_{ij} \underline{g}^i \otimes \frac{\partial \underline{g}^j}{\partial x^k} = \\ &= \frac{\partial t_{ij}}{\partial x^k} \underline{g}^i \otimes \underline{g}^j - t_{ij} \Gamma^i_{hk} \underline{g}^h \otimes \underline{g}^j - t_{ij} \underline{g}^i \otimes \Gamma^j_{hk} \underline{g}^h = \\ &= \left(\frac{\partial t_{ij}}{\partial x^k} - t_{hj} \Gamma^h_{ik} - t_{ih} \Gamma^h_{jk} \right) \underline{g}^i \otimes \underline{g}^j := t_{ij,k} \underline{g}^i \otimes \underline{g}^j \Rightarrow \boxed{t_{ij,k} = \frac{\partial t_{ij}}{\partial x^k} - t_{hj} \Gamma^h_{ik} - t_{ih} \Gamma^h_{jk}} \end{aligned}$$

En análogo en los restantes tipos de componentes (formulario). Todas estas fórmulas pueden expresarse matricialmente para cada k .

Algunas figuras (3)

•Lin. y Sup. Coord. del Sist. Cilíndrico

•ín. coordenadas del sist. coordenadas polares

celda elemental esférica

Parametrización de una superficie en $\mathbb{E}_3$