Tema 6

Funciones de varias variables

1. Halle los puntos de la curva $\begin{cases} x = t^2 - 1 \\ y = t^3 - t \end{cases}$ en que el módulo de la velocidad es mínimo.

2. Dada la circunferencia

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad a > 0$$

halle los vectores tangente y normal en un punto genérico. Calcule además la curvatura y el radio de curvatura.

3. Calcule la curvatura y la torsión de

$$\sigma(t) = \left(t, \frac{1+t}{t}, \frac{1-t^2}{t} \right)$$

en función del parámetro t .

4. Consideremos la hélice parametrizada por

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases} \quad a > 0, b \neq 0$$

Calcule :

- (a) el triedro de Frenet
- (b) la curvatura y la torsión
- (c) las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante en un punto genérico.

Discuta el caso $b = 0$

5. Sea $\sigma : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}^2$ definida por

$$\sigma(t) = \left(\sin t, \cos t + \log \left(\operatorname{tg} \frac{t}{2} \right) \right) \quad (\text{tractriz})$$

compruebe que σ es diferenciable, que la velocidad no se anula más que en $t = \frac{\pi}{2}$, y que la longitud del segmento de la tangente a la tractriz entre el punto de tangencia y el eje OY es igual a 1.

6. En una grúa como la de la figura, la carga se encuentra originalmente en el punto A de coordenadas $(0, 0, h)$. En el instante $t = 0$ empieza a moverse con velocidad horizontal u y vertical v , mientras la grúa gira con velocidad angular w . Las dimensiones lineales son las de la figura.

- (a) Describir la trayectoria de la carga.
- (b) Determinar el instante en que toca el suelo.
- (c) Coordenadas del punto en el que toca el suelo y velocidad en ese instante.

7. Estudiar la continuidad, existencia y continuidad de las derivadas parciales y diferenciabilidad de las funciones

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(b) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x y^2 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(d) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(e) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(f) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

8. Hallar todas las derivadas parciales de orden 1 y orden 2 de las funciones

$$(a) f(x, y) = e^{xy} + x^y + y^x + e^\pi$$

$$(b) f(x, y, z) = \arctg(xyz)$$

$$(c) f(x, y, z) = x^2 y^2 e^z + y^2 z^2 e^x + z^2 x^2 e^y$$

9. La distribución de temperaturas en una placa de metal viene dada por la función $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$. Calcule la dirección y sentido en la que aumenta la temperatura más rápidamente, partiendo del punto $(2, -3)$.
10. Determine el valor de las constantes a, b y c para que la derivada direccional de $f(x, y, z) = e^{ax+by+cz}$ en el punto $(0, 0, 0)$ tenga un valor máximo de 3 en la dirección y sentido de $\vec{v} = (1, -1, 1)$.

11. Consideremos la superficie $xy+yz+zx=1$. Calcule la ecuación del plano tangente en el punto $(1, 1, 0)$ y la ecuación de la recta normal.
12. Sean $A \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $C^3(A)$. Escriba el polinomio de Taylor de orden 2 de f en el punto $(x_0, y_0) \in A$.
13. Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Sus únicos puntos críticos son $(27, 42)$, $(0, 3)$, $(-1, -1)$ y los valores en dichos puntos son $f(27, 42) = 105$, $f(0, 3) = -2$, $f(-1, -1) = 0$. ¿Alcanza la función f sus valores máximo y mínimo absolutos en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$? ¿Y en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$?
14. Calcule los máximos y mínimos absolutos de la función $z = +\sqrt{3 + 2x - y^2 - x^2}$ en su dominio de definición.
15. Calcule los extremos absolutos de la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{xy}$ en el dominio $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
16. Halle las dimensiones del paralelepípedo de mayor volumen que se puede inscribir en el elipsoide :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

17. Halle los puntos de la curva $4x^2 + y^2 - 16x + 12 = 0$ que se encuentran más cerca y los que se encuentran más lejos del origen de coordenadas, determinando:

- (a) Puntos críticos.
 (b) Puntos a distancia mínima.
 (c) Puntos a distancia máxima.

18. Siendo $z = u^2v$, $u = x + y$, $v = xy$, hallar las derivadas parciales $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$

- (a) Aplicando la regla de la cadena.
 (b) Sustituyendo u y v por sus valores en función de x, y .

19. Siendo $z = z(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, hallar las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$

- (a) Siendo $f(x, y) = xuy$
 (b) Siendo $f(x, y) = x \frac{\partial u}{\partial x} z$

20. Sea $f(x, y) = \int_0^{\frac{y}{2}} \text{sen}(x + 2t) dt$, $g(x, y) = f(xe^y, x + y)$. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = g(x, y)$ en el punto $(\frac{\pi}{2}, 0)$.

21. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 con $\nabla f(2, 0) = (1, -3)$ y sea $g(x, y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$. Calcule $\frac{\partial}{\partial y}(f \circ g)(1, 1)$.

22. Sean $u(x, y) = \text{sen}(x - y) + \cos(x + y)$ y $\begin{cases} x = st \\ y = s^2 - t^2 \end{cases}$. Calcule $\frac{\partial u}{\partial s}$ y $\frac{\partial u}{\partial t}$

23. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$, $f(u, v)$, que verifica:

- $f(0, -1) = 1$

- $\frac{\partial f}{\partial u}(0, -1) = \frac{\partial f}{\partial v}(0, -1) = 0$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(0, -1) = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(0, -1) = 2$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(0, -1) = 0$

y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (x^2 + y, xy)$. Si $h = f \circ g$, demuéstrese que $(1, -1)$ es un punto crítico de h y determínese su naturaleza.

24. Sean A el conjunto $\mathbb{R}^2$ sin el punto $(0,0)$ y $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y) = (x^2 - y^2, xy)$. Justifique si f admite una inversa local en todo punto de A . ¿Tiene inversa global en A ?
25. Demuestre que la ecuación $xy + z + 3xz^5 = 4$ define a z como función implícita de x e y en un entorno del punto $(x, y, z) = (1, 0, 1)$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$.
26. Compruebe que el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} xu + yv - 4 = 0 \\ xy - uv + 4 = 0 \end{cases}$$

define a u y v como funciones diferenciables de x e y en un entorno del punto cuyas coordenadas son $x = 2$, $y = 0$, $u = 2$, $v = 2$.

Sabiendo que u tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, obtenga su polinomio de Taylor de grado 2 alrededor del punto $(x, y) = (2, 0)$.

27. (a) Demuestre que $f(x, y) = (xye^{xy}, x + y)$ admite una inversa local en $(1, 0)$. Si designamos a esta inversa por $g(x, y)$, calcule $Jg(0, 1)$ (matriz jacobiana de g en $(0, 1)$).
- (b) Demuestre que la ecuación

$$xu + ye^{2x-u} = 2$$

define implícitamente a u como función de x , y en un entorno del punto $(x, y, u) = (1, 0, 2)$. Si designamos a esta función por $u(x, y)$, calcule $\nabla u(1, 0)$.

(c) Calcule $\nabla(u \circ g)(0, 1)$.

28. Sean $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$) definidas por:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (e^x + y^2, e^z + y) \\ g(u, v) &= v^2 + \log u \end{aligned}$$

Calcule, si existe, la matriz Jacobiana de $g \circ f$ en el punto $(0, 0, 0)$.

29. Dadas las funciones:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & f(x, y) &= (y + \cos x, x + e^y) \\ g : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} & g(t, u) &= t + u \end{aligned}$$

Se pide:

- (a) Derivada de $F = g \circ f$ en el punto $(0, 0)$ según el vector $\vec{v} = (\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}})$.
- (b) Máximo valor de la derivada direccional de F en $(0, 0)$.
- (c) Comprobar que la ecuación $F(x, y) = 2$ define a y como función implícita de x en un abierto que contiene al punto $(0, 0)$.
- (d) Calcular la derivada de esa función implícita en el punto $x = 0$.
30. Compruebe que las curvas $3x - 2y + x^3 - x^2y = 0$, $x^2 - 2x + y^2 - 3y = 0$ son ortogonales en el origen.